

SKĀBBARĪBA (pārkot tehniskos pakalpojumus)

NEL = 5,63 MJ/kg saunas 1 kg skābbarība = 0,32 kg saunas	Mēr- vienība	1. gads (ierīkošana)			2.–5. gads (rituli)			2.–5. gads (stīrpas)		
		Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR	Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR	Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR
IEŅĒMUMI										
Virsaugs (viengadīgā aīrene)	t	15								
Skābbarība (ņemot vērā zudumus)	t				20			22		
NEL (neto enerģija laktācijai)	MJ	27 024			36 032			39 635		
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla virsaugam (ierīkošanai 15 kg/ha)	kg	15	2,10	31,50						
Sēkla (ierīkošanai 25 kg/ha)	kg	25	5,80	145,00						
Mēslojums:										
Tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (130:31:229)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (130:31:229)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (130:31:229)		
Šķīdumēslī (digestāts)	t	40	1,50	60,00	40	1,50	60,00	40	1,50	60,00
Kālija hlorīds	kg	250	0,41	102,50	250	0,41	102,50	250	0,41	102,50
Amonija sulfāts	kg	200	0,42	84,00	200	0,42	84,00	200	0,42	84,00
Plēve (8 m plata)	m							2,31	2,02	4,67
Konservants	l									55,00
KOPĀ uz 1 ha (1)				423,00	186,50				246,17	
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Šķīdumēslu izkliešanās	t	40	4,10	164,00	40	4,10	164,00	40	4,10	164,00
Minerālmēslu izkliešanās	reizes	3	20,64	61,92	3	20,64	61,92	3	20,64	61,92
Kultivēšana	reizes	1	36,88	36,88						
Pievelšana	reizes	1	23,31	23,31						
Sēšana	reizes	1	44,10	44,10						
Zāles pļaušana	reizes	2	46,40	92,80	3	46,40	139,20	3	46,40	139,20
Zāles ārdīšana/vālošana	reizes				3	32,58	97,74	3	32,58	97,74
Presēšana rituļos (ieskaitot plēvi)	reizes	2	153,19	306,38	3	136,17	408,50			
Zāles smalcināšana, transports	reizes							3	52,50	157,50
Ecēšana	reizes				1	25,00	25,00	1	25,00	25,00
Šķīvošana	reizes	1	44,29	44,29						
Aršana	reizes	1	68,83	68,83						
Masas blietēšana	h							1,32	51,25	67,65
KOPĀ (2)				842,51	896,36				549,01	
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (3=1+2)				1265,51	1082,86				795,18	
MAINĪGĀS IZMAKSAS 1 uz 1 kg			0,016	0,028	0,005 0,009			0,006 0,011		
MAINĪGĀS IZMAKSAS 2 uz 1 kg			0,031	0,084	0,025 0,054			0,014 0,036		
ATBALSTS										
Ilgspēju sekmējošais ienākumu pamatatlbalsts (ISIP)				80,61			80,61			80,61
Zālāju saglabāšanas veicināšana (EKO6)				49,00			49,00			49,00
KOPĀ				129,61			129,61			129,61
MAINĪGĀS IZMAKSAS 3 uz 1 kg			0,047	0,076	0,030 0,048			0,020 0,030		

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC augkopības konsultantes Ievas Kamerādes-Sniedzes un lauku saimniecību sniegtie dati.

Izstrādātais skābbarības bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas saskaņā ar ekspertu viedokli ir jāpielieto, lai šādos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.
Bruto segums sastādīts zālei, kas paredzēta skābbarības sagatavošanai un kas audzēta augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0–7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0–2,5%.
Zālājs tiek ierīkots uz pieciem gadiem. Sēklas maisījumā ietilpst sarkanais āboliņš, ganību aīrene, timotiņš un plavas auzene. Ja zāli noplauj savlaicīgi un ir atbilstoši laika apstākļi, tad ir iespējams iegūt 2. un pat 3. plāvumu. Ierīkošanas gadā tiek pieņemts, ka zāli izmanto zālības sagatavošanai.
Aprēķinot plēves daudzumu, tiek pieņemts, ka 500 t tranšējas nosegšanai ir nepieciešami 52,5 m plēves ar platumu 8 m.
Sēklas maisījuma un virsauga sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.
Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopotajām tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2025. gadā. Aprēķinot masas blietēšanas ilgumu, tiek pieņemts, ka 500 t tranšējas blietēšanai ir nepieciešamas aptuveni 30 stundas. Sagatavojot skābbarību rituļos, ir pieņemts, ka atāls tiek noganīts. Skābbarību vidēji transportē pa 4,8 t (mazās piekabēs, t. sk. graudu piekabēs) vai pa 14,4 t (lielās piekabēs).
2025. gadā lopbarības kultūru ražība Latvijā būtiski atšķiras starp reģioniem. Daļā teritoriju ilgstoši nokrišņi apgrūtināja vai pat padarīja neiespējamu lopbarības savākšanu, kā rezultātā samazinājās gan raža, gan kvalitāte. Savukārt, citos reģionos mitruma apstākļi bija optimāli, nodrošinot labu zālāju attīstību un ļaujot iegūt augstas, vietām pat rekordlielas ražas.
Sastādītais bruto segums pamatojas uz ilggadīgu audzēšanas pieredzi, bet to nevar uzskatīt par universālu un kategorisku. Katrā konkrētajā gadījumā ir jāveic korekcijas atbilstoši saimniekošanas tehnoloģijai un apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezālainība, cenas u. c.).